上士幌町役場保健福祉課健康増進担当

ヒトパピローマウイルス (HPV) ワクチンのご案内

日本で年間約 10,000 人が発症して約 3,000 人が死亡している子宮頸がんは、20~30 歳代で急増しています。主な原因がヒトパピローマウイルス (HPV) による性感染症で、感染前の 10 歳代にワクチンを接種することで、子宮頸がんを予防する効果があります。

接種につきましては、別添のパンフレットをよくお読みになり、さらに必要な情報につきましては、厚生労働省のホームページ等をご参照の上、ご検討くださいますようよろしくお願いいたします。

1.対象者 小学校6年生~高校 | 年生に相当する年齢の女性※標準的な接種期間(望ましい接種期間):中学 | 年生に相当する年齢の女性

2. ワクチンの種類

- ・現在、定期予防接種として接種できる HPV ワクチンは、3種類あり、各々の説明をよく読んでお選び下さい。注)接種の途中で種類を変えることはできません。予約までに種類を決めておきましょう。
- ・接種の回数や間隔はそれぞれ少し異なりますが、いずれのワクチンも、半年~ | 年の間に決められた回数、接種することが必要です。
- ・シルガードは、15歳になるまでに | 回目を受けた場合は2回接種。15歳になってから | 回目を受ける場合は3回接種になります。
- ・接種には、保護者の方の同意が必要です。

ワク 種	'チンの 類	サーバリックス (2 ^{価ワクチン})	ガ―ダシル(4価ワクチン)	シルガード(9価ワクチン	<i>י</i>)	
予防する HPV の型		16·18 型 (高リスク型)	16・18 型(高リスク型) 6・11 型(低リスク型だが、性 病である尖圭コンジローマの 原因)	16・18・31・33・45・52・58 型(高リスク型) 6・11 型(低リスク型だが、性病である尖圭コンジローマの原因)		
一般 的な 種 間隔	1回目	初回接種	初回接種	初回接種(15 歳未満)	初回接種(15 歳以上)	
	2 回目	1回目から 1か月後に接種	初回接種から 2か月後に接種	初回接種から6か月 後に接種	初回接種から 2か月後に接種	
	3回目	1回目から 6 か月後に接種	1回目から 6 か月後に接種		1回目から 6 か月後に接種	
接種方法		ワクチン(0.5ml)を筋肉注射				

- ★サーバリックス~一般的な接種間隔で出来ない場合、2回目は1回目から1か月以上、3回目は1回目から5か 月以上、2回目から2か月以上あけます。
- ★ガーダシル〜一般的な接種間隔で出来ない場合、2回目は1回目から1か月以上、3回目は2回目から3か月以上あけます。
- ★シルガード~1 回目と 2 回目は少なくとも 5 か月以上あけます。5 か月未満の場合、3 回目の接種が必要。

3. 予診票(2種類、3枚ずつ同封しています)

保護者が同伴で接種する場合 → びわ色の予診票(様式第三)をご利用ください。 保護者が同伴せずに接種する場合 → 白色の予診票を(様式第四)をご利用ください。

★15 歳未満の予防接種は、原則、保護者の同伴が必要です。

4. 実施医療機関

医療機関 (電話番号) 【ワクチン種類】	受付時間	予約	持ち物
はげあん診療所 (2-5678) 【シルガード9、ガータシル】	月火木金 9:30~15:30	1 週間前までに予約	
豊川小児科内科医院 (0155-32-2310) 【シルガード9、ガータシル、サ ーバリックス】	月火水木金土 8:00~11:00 月火木金 14:00~17:20	予約必要 iPhone 77 リ Android 77 リ Google play	•母子手帳
慶愛病院 (0155-22-4188) 【シルガード 9 、ガータシル】	月 9:15~ 9:45 14:00~16:00 火木 10:00~10:30 13:30~16:00 水金 10:00~10:30 14:00~16:00 土 10:00~10:30 13:00~14:00	小児科ページ内 WEB 予約ボタンより予約必要 「アプロート」 「アプロート 「アプロート 「アプロート 「アプロート 「アプロート	・母子手帳 ・子ども医療費 受給者証 ・健康保険証 ・予診票
帯広徳洲会病院 (0155-32-3030) 【シルガード9、ガータシル】	予約時にご確認ください	1 週間前までに予約	

●ご案内に関するお問い合わせ先

上士幌町役場保健福祉課健康増進担当 電話2-4|28